



PRECAUTIONS

احتياطات

- Ne pas faire de toilette vaginale
- ينهى القيام بتنظيف مهبل قبل الاختبار.
- Ne pas uriner 1h00 avant le prélèvement pour les femmes enceintes et 2h00 pour les autres.
- ينهى التبول ساعة قبل أخذ العينات للنساء الحوامل وساعتين للآخرات.
- La patiente devra éviter tout traitement local (crème, gels, savons...), afin de ne pas fausser les résultats.
- يتوجب على المريضة تجنب أي علاج موضعي (كريم، جل، صابون...), لكيلا تتأثر النتائج.
- Il est conseillé d'éviter le prélèvement pendant la période menstruelle car la flore est modifiée (sauf avis contraire du prescripteur).
- يُنصح بتجنب أخذ العينات خلال فترة الحيض (ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل الطبيب).
- Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique (> 15 jours pour les chlamydiae, > 5 jours pour les germes banaux).
- يجب أخذ العينة قبل أو على مسافة من أي علاج مضاد حيوي (< 15 يومًا للكلاميديا، < 5 أيام للجراثيم الشائعة).
- Ne pas mettre d'ovule vaginal pendant les 5 jours précédant le prélèvement.
- لا تضع بيضة مهبلية خلال الـ 5 أيام التي تسبق أخذ العينات.

Ce document ne peut être reproduit sans autorisation écrite du Laboratoire Semlali