



PRECAUTIONS

احتياطات

1. Laver les mains au savon. Faire une toilette génito-urinaire à l'eau et au savon et bien rincer.
- اغسل يديك بالصابون. اغسل الجهاز البولي التناسلي بالصابون والماء وشطفه جيدًا.
2. Rejeter le premier jet de la miction dans les toilettes, puis recueillir le 2^{ème} jet à la volée dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.
- ارم الرذاذ الأول من التبول في المرحاض، ثم اجمع الرذاذ الثاني في القارورة المعقمة المقدمة من طرف المختبر.
3. Fermer le flacon hermétiquement. Nettoyer l'extérieur du flacon et identifier le flacon.
- اغلق القارورة بإحكام، نظف القارورة من الخارج وسجل الاسم عليها.
4. Porter le recueil d'urine au laboratoire dans les plus bref délai (<2 heures).
- خذ العينة إلى المختبر في أقرب وقت ممكن (أقل من ساعتين).

Important : Si possible avant tout traitement antibiotique et de préférence 3 heures après la dernière miction.

هام: إذا كان ذلك ممكنًا قبل أي علاج بالمضادات الحيوية ويفضل بعد 3 ساعات من التبول الأخير.

Renseignements obligatoires :

المعلومات المطلوبة :

Nom, prénom _____

الاسم الكامل _____

Date de naissance ____/____/____

تاريخ الازدياد ____/____/____

Prélèvement le ____ à ____

تاريخ العينة مع _____

Antibiotique ? ☐ Oui ☐ Non

دواء مضاد حيوي ؟ ☐ نعم ☐ لا

Si oui, nom _____

إذا كان الجواب نعم، الاسم: _____

Ce document ne peut être reproduit sans autorisation écrite du Laboratoire Semlali