



PRECAUTIONS

احتياطات

- **Arrêt, depuis au moins 4 semaines avant le test, de tout traitement antibiotique.**
- توقف، لمدة لا تقل عن 4 أسابيع قبل الاختبار، عن أي علاج بالمضادات الحيوية.
- **Arrêt des anti-sécrétoires depuis 2 semaines :**
- توقف، لمدة لا تقل عن 2 أسابيع قبل الاختبار، عن:
IPP : Inexium, Lanzor, Ogast, Mopral, Omeprazole, Zoltum, Eupantol, Inipomp, Pariet.
anti-H2 : Stomedine, Tagamet, Pepcidac, Pepdine, Nizaxid, Azantac, Raniplex, Pepciduo. *Et autres* (Cytotec, Keal, Ulcar).
- **Arrêt des anti-acides et pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures :**
- توقف عن مضادات الحموضة والمضادات المعدية المعوية لمدة 24 ساعة:
- Digestif Marga, Gelusil, Isudrine, Maalox, Moxydar, Phosphalugel, Rennie, Riopan, Rocgel, Xolaam, Actapulgit, Bedelix, Smecta, Bolinan, Poly-Karaya, Pepsane, Polysilane, Siligaz, Acidrine, Contracide, Gastropulgite, Gelox, Kaomuth, Mutésa, Neutroses.
- **Vous devez être à jeun depuis au moins 6 heures ou de préférence depuis la veille du jour du test.**
- يجب أن تكون صائماً لمدة 6 ساعات على الأقل أو يفضل منذ اليوم السابق للاختبار.
- **Ne pas fumer depuis la veille.**
- لا تدخن منذ اليوم السابق.

REALISATION DU TEST

- Le test doit être effectué au Laboratoire en présence d'une personne qualifiée.
- يجب إجراء الاختبار في المختبر بحضور شخص مؤهل.

Ce document ne peut être reproduit sans autorisation écrite du Laboratoire Semlali